Poser la coupelle sur la balance et faire la tare.

Prélever la masse de soluté voulue:

m (en g)

Verser, à l'aide d'un entonnoir, le solide prélevé dans une fiole jaugée de volume voulu:

V (en L)

Rincer la coupelle et l'entonnoir en récupérant les eaux de rinçage.



Remplir la fiole jaugée à la moitié.



Agiter jusqu'à ce que le soluté soit complètement dissous.



Bien viser le bas du ménsique

Compléter avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge.



Agiter pour que la solution soit homogène.

$C_m = m / V$ (en $g.L^{-1}$)

Poser la coupelle sur la balance et faire la tare.

Prélever la masse de soluté voulue:

m (en g)

Verser, à l'aide d'un entonnoir, le solide prélevé dans une fiole jaugée de volume voulu:

V (en L)

Rincer la coupelle et l'entonnoir en récupérant les eaux de rinçage.



Remplir la fiole jaugée à la moitié.



Agiter jusqu'à ce que le soluté soit complètement dissous.



Bien viser le bas du ménsique

Compléter avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge.



Agiter pour que la solution soit homogène.

$C_m = m / V$ (en $g.L^{-1}$)